

Вопросы
для подготовки к дифференцированному зачету по
ПМ 03 МДК 03.01 Основы реаниматологии
34.02.01 Сестринское дело

1. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит пациент, обязательно должна быть
2. «Тройной» прием для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает
3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку двумя лицами
4. Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку
5. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить
6. Глубина продавливания грудной клетки при проведении закрытого массажа сердца новорожденному
7. Для клинической смерти не характерно
8. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные мероприятия можно прекратить через
9. Утрата всех видов чувствительности - это:
10. Мероприятия неотложной помощи при приступе стенокардии:
11. Характерные симптомы острой дыхательной недостаточности (ОДН)
12. Клинические проявления анафилактического шока:
13. Потенциальная проблема пациента при отеке Квинке:
14. Если у больного после введения инсулина появляется дрожание конечностей, чувство голода - это:
15. При своевременно замеченной фибрилляции желудочков следует немедленно:
16. Прекардиальный удар - это резкий удар в грудную клетку
17. Лекарственный препарат, применяемый для профилактики травматического шока:
18. Если во время гипертонического криза появилась сильнейшая боль за грудиной, не снимающаяся нитроглицерином, это:
19. Условия, которые необходимо соблюдать при госпитализации больных с острым инфарктом миокарда:
20. Первые клинические признаки кардиогенного шока:
21. При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят
22. Признак эффективности реанимационных мероприятий
23. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии
24. Признаки клинической смерти

25. Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку
26. Приступ стенокардии купируется:
27. Для купирования приступа бронхиальной астмы, м/с должна подготовить:
28. Основным признаком коматозного состояния:
29. Первые клинические признаки кардиогенного шока:
30. Достоверным диагностическим критерием инфаркта миокарда является:
31. Если во время гипертонического криза появилась сильнейшая боль за грудиной, не снимающаяся нитроглицерином, это:
32. Сестринские вмешательства при приступе бронхиальной астмы:
33. Доврачебная неотложная помощь при диабетической коме:
34. Верхним пределом нормального артериального давления считаются цифры
35. Первая помощь при явлениях отека Квинке
36. Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутривенного введения лекарственного препарата, то в первую очередь необходимо:
37. Клиническими проявлениями острой сосудистой недостаточности являются
38. Для купирования явлений отека легких больным показана оксигенотерапия
39. На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение
40. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним лицом